

# Leishmaniose



Maladie	Bactérienne <input type="checkbox"/>	Virale <input type="checkbox"/>	Parasitaire <input checked="" type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>
Principales espèces animales touchées	Carnivores (chien, renard, blaireau). Le rat noir et d'autres mammifères pourraient également être parasités			
Zoonose (transmissible à l'homme)	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Maladie réglementée (déclaration obligatoire, mesures de police sanitaire)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Résistance de l'agent contaminant	Dans le milieu naturel :	Non résistant		
	Au froid :			
	Au chaud :			
	Aux agents chimiques :			

DANS LA FAUNE SAUVAGE	
Maladie mortelle	Non
Symptômes	Amaigrissement, abattement, plaque rouge (pendant 6 mois) puis dépilations débutant généralement au sommet du crâne et autour des yeux, gros ganglions, démangeaisons
Organes atteints	Peau, ganglions, sang
Causes de la maladie	Parasite : <i>Leishmania</i> (petit protozoaire) Parasite transmis par un moustique : le phlébotome
Période(s) critique(s)	Correspond aux périodes chaudes propices au développement du moustique. Pic en été. Cette maladie est présente surtout au sud de la Loire
Voies de contamination	Piqûre par un moustique infecté par un repas antérieur sur un animal porteur
Prévention	

Risque de passage animaux sauvages ↔ domestiques	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	
	Voies de contamination	
	Espèces sensibles	
Direct <input type="checkbox"/> Indirect <input type="checkbox"/>	Prévention	
Risque de transmission aux chiens de chasse	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
	Dangerosité	Risque de rechutes, nécessite l'injection d'antimoine tous les jours pendant plusieurs semaines
	Prévention	Eviter les zones à fortes densités de moustiques, traitement anti-moustique

CHEZ L'HOMME RISQUE DE TRANSMISSION** : +	
Gravité de la maladie	Grave pour un individu immunodéprimé (pour la forme viscérale)
Symptômes	- Forme viscérale (=généralisée) : perte de poids, fatigue, fièvre, grosse rate et gros foie - Forme cutanée : boutons rouges sur la peau (pas seulement au point d'inoculation)
Organes atteints	Rate, foie, peau, sang
Causes de la maladie	Parasite : <i>Leishmania</i> (petit protozoaire) Parasite transmis par un moustique : le phlébotome
Période(s) critique(s)	Correspond aux périodes chaudes propices au développement du moustique. Pic en été. Cette maladie est présente surtout au sud de la Loire
Voies de contamination	Peau saine <input type="checkbox"/> Alimentation <input type="checkbox"/> Peau blessée <input type="checkbox"/> Inhalation <input type="checkbox"/> Muqueuses <input type="checkbox"/> Piqûre d'insecte <input checked="" type="checkbox"/>
Prévention	Protection contre les moustiques
Traitement	Médicaments de la famille des antimoniates ou l'amphotéricine B (effets secondaires importants) Durée du traitement : 3 semaines
Maladie professionnelle	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>

\*\*Importance du risque de transmission : + à +++