

# Peste Porcine Classique



Maladie	Bactérienne <input type="checkbox"/>	Virale <input checked="" type="checkbox"/>	Parasitaire <input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>
Principales espèces animales touchées	Suidés : Sanglier, Porc			
Zoonose (transmissible à l'homme)	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Maladie réglementée (déclaration obligatoire, mesures de police sanitaire)	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Résistance de l'agent contaminant	Dans le milieu naturel :	Peu résistant		
	Au froid :	Résiste à la congélation		
	Au chaud :	Sensible à la cuisson		
	Aux agents chimiques :	Sensible à la soude 1%		

DANS LA FAUNE SAUVAGE	
Maladie mortelle	La maladie peut être mortelle. Elle est de plus extrêmement contagieuse.
Symptômes chez le lièvre	Peu visibles à distance sur les sangliers : Fièvre, perte d'appétit, conjonctivite, paralysie du train postérieur.
Organes atteints	Rate hypertrophiée et hémorragique. Signes d'inflammation et d'hémorragie sur les reins, la vessie, les amygdales.
Causes de la maladie	Virus de la famille des <i>Flaviridae</i> (genre <i>Pestivirus</i> ).
Période(s) critique(s)	-
Voies de contamination	La transmission se fait par contact de " groin à groin " ou à distance par les aérosols, par du matériel contaminé. De plus, les carcasses de sangliers sont très contagieuses pour le sanglier et le porc, s'ils les consomment, si elles sont laissées dans la nature ou si elles sont transportées sans protection (elles contaminent l'environnement et le matériel)
Prévention	- Empêcher toute possibilité d'introduire le virus (introduction de sangliers au statut sanitaire non garanti, nourrissage avec des déchets de porc ou de sanglier, ...) - Gestion des populations de sangliers. - Quand un foyer éclate, éviter le dérangement des hardes.

Risque de passage animaux sauvages ↔ domestiques	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Voies de contamination : Contact direct, environnement, matériel contaminé.
	Espèces sensibles : Porcs
Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect <input checked="" type="checkbox"/>	Prévention : Eviter tout contact porcs-sangliers. Les personnes doivent désinfecter tout matériel (bottes, voitures, outils).
Risque de transmission aux chiens de chasse	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
	Dangerosité : -
	Prévention : -

