



Newsletter Sanitaire

saison 2026/2027 - Numéro 1


Nous souhaitons attirer votre attention sur deux actualités importantes concernant la surveillance sanitaire du gibier sauvage.

// ZACHARIE : l'examen initial passe au numérique

Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire met à disposition Zacharie, une application permettant de réaliser directement en ligne la fiche d'examen initial du gibier sauvage.

Cet outil s'adresse notamment aux chasseurs formés à l'examen initial et permet de simplifier et de dématérialiser la fiche d'accompagnement du gibier sauvage.

Depuis un smartphone ou un ordinateur, les informations sanitaires et de traçabilité peuvent être enregistrées et transmises, y compris hors connexion. Les différents acteurs disposent ainsi d'un format numérique partagé et traçable.



Zacharie permet notamment de faciliter la transmission des informations et d'améliorer le suivi sanitaire et la traçabilité de la venaison.

Pour en savoir plus sur Zacharie, cliquez sur les liens suivants :

<https://zacharie.beta.gouv.fr/>

[Vidéo de promotion](#)

[Manuels d'utilisations](#)

// Première détection en France d'un parasite exotique : *Fascioloides magna*

Le réseau SAGIR a été informé en juin 2026 de la découverte, en Sologne, de plusieurs trématodes de grande taille dans le foie sévèrement atteint d'un daim prélevé à la chasse.

L'identification morphologique est compatible avec *Fascioloides magna*. Il s'agit, à notre connaissance, de la **première détection de ce parasite en France**.

Originaire d'Amérique du Nord, ce parasite est aujourd'hui présent dans plusieurs régions d'Europe. Il se développe notamment grâce à des mollusques d'eau douce, qui jouent le rôle d'hôtes intermédiaires, et à plusieurs espèces de cervidés.

Quels animaux sont concernés ?

En Europe, les principaux **hôtes définitifs** sont :


- le cerf élaphe
- le daim
- le chevreuil

Chez ces espèces, l'infestation peut notamment entraîner des lésions hépatiques importantes. Une baisse de la prise de poids, une diminution de la qualité des bois ou des perturbations du rut peuvent également être observées.

Le mouton, la chèvre et le mouflon peuvent être des hôtes aberrants, chez lesquels l'infestation peut avoir des conséquences mortelles.

À l'inverse, le sanglier fait partie des hôtes impasses et ne participe donc pas, ou très peu, au maintien du cycle du parasite.

Photos du parasite adulte (ci-contre) et de l'œuf (ci-dessous)



Un parasite associé aux milieux humides

Le cycle de *Fascioloides magna* dépend notamment de la présence de **milieux humides favorables** et de mollusques d'eau douce.

Des investigations menées début juillet par l'OFB et la FDC41 sont en faveur d'un **cycle local déjà bien installé**, mais l'étendue de la zone infestée reste à déterminer. De nouvelles investigations sont prévues à l'automne.

À ce jour, aucun enjeu zoonotique n'est identifié pour *Fascioloides magna*.

Cette découverte rappelle toute l'importance de la **vigilance lors de l'examen initial du gibier**.

Face à des lésions inhabituelles, notamment au niveau du foie des cervidés, **soyez attentifs et signalez toute anomalie** conformément aux procédures de surveillance sanitaire.



ZAE Péri Ouest
5 Boulevard de Saltgourde
24430 MARSAC SUR L'ISLE

☎ 06 86 17 70 50
✉ m.balaine@chasseurs24.com
🌐 www.chasseurs24.com

Suivez-nous sur les réseaux



ACTEURS DE LA NATURE, PARTENAIRES DU VIVANT